

tetesept: BABY



BÄUCHLEIN ENTSPANNUNGS TROPFEN SIMETICON

Medizinprodukt
Tropfen zum Einnehmen

Produkt basierend auf: Simeticon (40 mg/0,6 ml) in Ölemulsion, Vitamin E, Coenzym Q und Silica.

Anwendungsgebiete: tetesept Baby Bäuchlein Entspannungstropfen ist ein Medizinprodukt, das zur Behandlung der folgenden Erkrankungen verwendet wird: Dyspeptische Beschwerden, gastrointestinaler Meteorismus, Aerophagie oder Gaskolik bei Babys, Kleinkindern, Kindern und Erwachsenen

Dosierung und Art der Anwendung: Der Simeticon-Gehalt beträgt 40 mg in 0,6 ml Lösung. Einzeldosis: 20 Tropfen tetesept Baby Bäuchlein Entspannungstropfen (= 0,6 ml).

Erwachsene (12 Jahre oder älter): 20–40 Tropfen, eventuell in Flüssigkeit verdünnt, bevorzugt nach den Mahlzeiten, 2- bis 4-mal täglich oder laut ärztlichem Rat.

Kinder (1–12 Jahre): 20 Tropfen, eventuell in Flüssigkeit verdünnt, bevorzugt nach den Mahlzeiten, 1- bis 3-mal täglich oder laut ärztlichem Rat.

Babys & Kleinkinder (0–1 Jahr): 20 Tropfen, eventuell in Flüssigkeit verdünnt, bevorzugt nach den Mahlzeiten, 1- bis 2-mal täglich oder laut ärztlichem Rat.

Gebrauchsanweisung: Produkt vor dem Gebrauch gut schütteln. Flasche nach dem Gebrauch gut verschließen.

Lagerbedingungen: Bei Zimmertemperatur lagern. Lagern Sie das Produkt gut verschlossen fernab von Hitzequellen. Das Produkt sollte innerhalb von 30 Tagen nach dem Öffnen verbraucht werden.

Warnhinweise: Für das Produkt gelten keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, wir weisen jedoch auf Folgendes hin:

- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 30 Tage.
- Das Produkt kann sich in zwei Schichten absetzen. Nach dem Schütteln sollte sich eine homogene Emulsion ergeben.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Überschreiten Sie die empfohlene Dosis nicht.
- Nicht nach dem Ablaufdatum verwenden; das Ablaufdatum gilt für ein unversehrtes und korrekt gelagertes Produkt.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Sämtliche Bestandteile des Produkts, einschließlich der Pipette, müssen unversehrt sein.
- Wenden Sie sich nach einem kurzen Behandlungszeitraum (7 Tage) ohne deutliche Ergebnisse an Ihren Arzt.
- Stellen Sie den Gebrauch des Produkts im Falle von Nebenwirkungen ein und wenden Sie sich für eine geeignete Behandlung an Ihren Arzt.
- Wird die Pipette während des Gebrauchs verschmutzt, reinigen Sie diese gründlich, bevor Sie sie wieder in die Flasche einführen, um mögliche Verunreinigungen zu vermeiden.

Nicht bei Verdacht auf Darm- oder Ileus-Perforation verwenden.

Durch die Beachtung der Anweisungen in der Packungsbeilage wird das Risiko von Nebenwirkungen gesenkt. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker unbedingt über Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

Informieren Sie im Falle eines schweren Unfalls im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt den Hersteller oder die zuständige Behörde hierüber.

Gegenanzeigen: Nicht im Falle von Überempfindlichkeitsreaktionen auf die Produktbestandteile verwenden.

Wechselwirkungen und Inkompatibilitäten: Verwenden Sie dieses Produkt im Falle einer Behandlung mit Arzneimitteln auf Grundlage von Levothyroxin oder Carbamazepin nur nach Einholung von ärztlichem Rat.

Die gleichzeitige Einnahme von Simeticon mit dem Folgenden wird nicht empfohlen:

- Abführmittel auf Mineralölbasis (Paraffin), da die Kombination der beiden Produkte deren Wirksamkeit verringert.
- Cefradin, Gliclazid, Cimetidin, Ranitidin, Chinidin, Cefuroxim, Phenytoin, da die Wechselwirkungen die Aufnahme dieser Produkte behindern können.
- Antithrombozytäre oder gerinnungshemmende Arzneimittel, wie etwa Warfarin oder Acetylsalicylsäure, da diese das Risiko von Blutungen erhöhen können, insbesondere in Verbindung mit einer geringen Vitamin-K-Aufnahme.

Schwangerschaft und Stillzeit: Schwangerschaft: Es liegen keine ausreichenden Daten zum Gebrauch des Produkts bei schwangeren Frauen vor, es sollte daher nur bei tatsächlichem Bedarf und nach der Beurteilung durch den Arzt verwendet werden.

Stillzeit: Es ist nicht bekannt, ob Simeticon über die Muttermilch ausgeschieden wird, es sollte daher nur bei tatsächlichem Bedarf und nach der Beurteilung durch den Arzt verwendet werden.

Verkehrstüchtigkeit: Es sind keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen bekannt.

Nebenwirkungen und Überdosierung:

Wie alle Produkte auf Simeticon-Basis kann dieses Medizinprodukt Nebenwirkungen verursachen, auch wenn diese nicht bei allen Personen auftreten.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie während der Behandlung mit tetesept Baby Bäuchlein Entspannungstropfen die folgenden Nebenwirkungen bemerken:

- Erbrechen, Durchfall, Unterleibsschmerzen, Schmerzen des Ileums, Übelkeit
- Ausschläge
- Schwellungen des Gesichts, der Augen und Lippen, Schwellung des Halses mit Atemschwierigkeiten (Angioödem)

Diese Nebenwirkungen treten selten auf. Es sind keine Auswirkungen einer Überdosierung bekannt.

Darreichungsform: tetesept Baby Bäuchlein Entspannungstropfen ist ein Medizinprodukt, das aus einer Flasche mit Pipette besteht, die eine ölige Simeticon-Lösung enthält.

tetesept Baby Bäuchlein Entspannungstropfen sind als 20 ml Version erhältlich.

Entsorgung: bitte beachten Sie ihre lokalen Entsorgungs-Richtlinien.

Hersteller:

 Gruppo Farmaimpresa srl,
Via Cipro 1, IT-Brescia
www.farmaimpresa.it
info@farmaimpresa.it

Vertrieb:



Merz Consumer Care GmbH
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main
Tel.: +49-(0)69 / 15 03 - 0
Fax: +49-(0)69 / 15 03 - 571
E-Mail: mlc_info@merz.de

Art. Nr. 200001259

 0426



Temperaturbereich Lagerung



FT.MDR.26.12.F00



Medizinprodukt

Stand der Information: 2023-11

