

GEBRAUCHSINFORMATION

Colosan - Lösung zum Eingeben für Tiere

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber / Hersteller: SaluVet GmbH, Stahlstraße 5, D-88339 Bad Waldsee, Deutschland

Vertrieb in Österreich: VANA GmbH, Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6, A-1020 Wien, Österreich

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Colosan - Lösung zum Eingeben für Tiere

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Sternanisöl	1 g
Bitterfenchelöl	1 g
Kümmelöl	1 g
Kassiaöl	1,7 g
Schwefel	2,5 g

Sonstige Bestandteile:

Leinsamenöl ad 100 g

Dunkelbraune, viskose ölige Lösung

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Unterstützende Behandlung bei Störungen des Magen-Darm-Traktes:

- bei Futterblähungen aller Art
- Trommelsucht der Kaninchen
- Unterstützung der Lebertätigkeit und Vorbeugung leberbedingter Stoffwechselstörungen
- entzündliche Durchfälle (vor allem der Kälber)

Die Anwendung dieses pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Tradition.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen (u.a. Zimt- oder Fenchelöl) oder einem der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Bei entsprechender Disposition sind Allergien gegen Zimt- oder Fenchelöl möglich.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Kaninchen und Hunde

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Dosierung:

Bei Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen, Hunden und Kaninchen wird In Abhängigkeit vom Körpergewicht folgendermaßen dosiert:

Gewichtsklasse	Dosis in ml/10 kg	Dosis in mg/kg	Beispiele
<10 kg	3 ml/10 kg	300 mg/kg	Kaninchen 1 kg: 0,3 ml
10 kg-100 kg	1 ml/10 kg	100 mg/kg	Fohlen 75 kg: 7,5 ml
100-600 kg	0,3 ml/10 kg	30 mg/kg	Pferd 500 kg: 15,0 ml

Geben Sie Colosan unverdünnt ein.

Entnahme mit Dosierhilfe (Spritze): Spritze ohne Nadel in Flaschenkonus einführen. Benötigte Menge Colosan entnehmen und dem Tier oral verabreichen.

Eingabe seitlich in die Backentasche. Etwa ½ Stunde nach der Eingabe Tränkwasser zur Verfügung stellen.

Im Falle der kleinschaumigen Gärung bei Rind, Schaf und Ziege: Eingabe zusammen mit ca. 0,25-1 l Speiseöl.

Häufigkeit und Dauer der Anwendung:

Bei Bedarf Wiederholung der Eingabe nach 0,5-2 Stunden.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg nicht eintritt ist ehestens eine tierärztliche Beratung erforderlich. Das Präparat darf nicht über längere Zeit ohne Rücksprache mit dem Tierarzt verabreicht werden.

10. WARTEZEIT(EN)

Null Tage

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern, Lichtschutz erforderlich, Präparat daher stets im Umkarton aufbewahren.

Sie dürfen das Tierarzneimittel, nach dem auf dem Karton bzw. dem Etikett des Behältnisses angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Wie alle Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt anwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Wenn dieses Arzneimittel gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Mai 2020

15. WEITERE ANGABEN

Z.-Nr. 8-00287

Packungsgrößen: 100 ml / 250 ml

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.